


DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

Scarlatina Cynanchica.





DISSERTATIO MEDICA

IN AUGURALIS

DE

Scarlatina Cynanchica.





2

DISSERTATIO MEDICA  
INAUGURALIS,  
DE

Scarlatina Cynanchica :

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S.S.T.P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ Praefecti;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto,

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

ANDREAS COVENTRY,

SCOTUS,

Societ. Reg. Med. Edin. Soc. Extraord.

Et Soc. Physic. Chirurg. Sod.

Prid. Id. Septemb. hora locoque solitis.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,

Academiae Typographos.

---

M,DCC,LXXXIII.







Viro illustrissimo, et imprimis ornato,

JACOBO PRINGLE,

EQUITI BARONETTO,

De STITCHILL, in comitatu ROXBURGH;

Quem, qualem esse decet, fidelem experti,

Semel atque iterum in Senatum legerunt Britanni;

Nec non,

Reverendo viro,

GEORGIO COVENTRY,

Patri suo;

Illi ob amicitiam et officia,

Huic propter curam et amorem,

Quibus se nunquam non profecuti sunt;

Utrique in animi devinctissimi gratique testimonium,

Hanc dissertationem medicam,

Ea, qua par est, observantia,

Oblatam voluit

A U C T O R.



## CORRIGENDA.

*Pag. 19. lin. 20. post laboranti, pone esset.*

- |     |     |   |
|-----|-----|---|
| 29. | 19. | <i>pro propagare, lege propagari.</i>                                       |
|     | 21. | <i>rationibus, regionibus.</i>  |
| 35. | 23. | <i>Ex, Et.</i>  |
| 36. | 12. | <i>attactura attingenda.</i>  |
| 46. | 20. | <i>medicamentibus, lege medicamentis<br/>stimulantibus.</i>                 |
| 49. | 1.  | <i>sumpti, sumpta.</i>  |
|     | 8.  | <i>adjuncta, quoque repellitur, lege ad-<br/>juncta. Repellitur quoque.</i> |
|     | 12. | <i>addicendum, lege ad dicendum.</i>  |
| 54. | 12. | <i>hoc, haec.</i>   |



## PROOEMIUM.

**E**ST inter artes scientiasque quasi foedus quoddam ac conjugium, quo lucem sibi invicem, vim et dignitatem, praebent. Talem inter eas sortita est medicina locum, ut ex ea, tanquam ex centro communi, in alias multas acies mentis dirigatur. Namque non satis est, si eam callere velles, ut corporis humani tantummodo fabricam scires. Ex variis enim rebus externis pendet sanitas, variisque per naturam explorandis remediis, si laesa sit, restituenda. Nunquam igitur sine voluptate summa in mentem venit, quod animum tandem aliquando ad medicinam incubuerim, quodque in ea orbis terrarum regione natus fuerim, ubi, fructu et puritate, istiusmodi disciplinae traduntur.

De medicinae partibus, quae mihi obversabantur, cum difficilior, tum magis investigatione digna, quam quae exanthematum naturam complectitur, nulla visa est. Variarum quas induit scarlatina cynanchica species, et multifaria, quam subiit, quaeque maximas ei tenebras offundit, descriptio; quum praesertim nuper adeo frequenter, violenter, ac funeste debacchatus sit; omni conatui, utcunque exiguo, ad naturam ejus indagandam



gandam suscepto, veniam sine dubio conciliabunt. Ex argumentis variis, de quibus lauream medicam ambientes agant oportet, unum quod hactenus eo sit tractatum modo, ut juvenem omnia perscrutanti in pauca conferre liceat, seligere difficile est. Nec hoc mihi contigit. De scarlatina, quanquam sero tantum ad eam medici animum converterint, complures tamen scriptores differuerunt. Ne autem plus quam ferant humeri, aut brevitatis talium dissertationum sinat, ad exarandum suscepissem, de notioribus verba feci. Quam de morbi a cynanche maligna differentia conversam instituerunt nuperi, sedulo vitavi; quoniam in limites tam angustos redigi haud possit, parumque ad utriuslibet curationem conducatur. Fateor tamen, opinionem esse maxime probabilem unius eos esse generis, ac variari, prout laborantes res variae circumstantes, causae remotae dictae, simul afficiant. Quam tradidi curandi ratio simplex est; verum, ut spero, usu confirmata. Remedia pauciora enumeravi; ea enim undiquaque colligere ac coacervare quasi, quod nimis saepe fecerunt nostrae artis studiosi, exitio medicinae atque opprobrio semper duxi.

Methodum, quam usurpavi, rem totam tractandi, aliorum est iudicii; sed ab eximiis meis Professoribus, in alma hac et florentissima academia, medicam aliasque scientias docentibus obnixè peto ac contendo, ut novissimum hoc tentamen ea, qua erga me per annos septem usi sunt, benignitate accipiant.



DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

## Scarlatina Cynanchica.

DEFINITIO.

**P**YREXIA contagiosa, semel tantum aliquem ad-  
oriens; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae  
in faucibus sensu; tumor, rubor, et dolor, tonsillas et  
membranam faucium mucosam afficientes, cum crustis  
mucosis, coloris albescentis vel cineritii, serpentibus et  
ulcera tegentibus; tertio morbi die, facies aliquantum  
tumens; simul in cute passim rubicunda efflorescentia,  
maculis amplis, vix eminentibus, tandem coalescentibus,  
post tres vel quatuor dies in squammulas furfuraceas abi-  
ens; superveniente saepe anasarca.

A

HISTORIA



## HISTORIA MORBI.

Medici, Scarlatinam Cynanchicam diversam speciem in aegris ac temporibus diversis prae se ferre, consentiunt. Indolis, enim, est interdum adeo benignae, ut parum quidem molestiae laboranti afferat, et sine ope medicamentorum depelli queat, vel potius sponte decedat; alias vero tam late grassatur, tamque cito et potenter ad orcum ducit, ut nulla valeat curatio, vel praecavere vel jam adortam lenire. Huncce tamen morbum, revera varium et mutabilem, five numerum five diversitatem spectemus symptomatum, iis, quorum enumeratio subsequitur, semet in plurimis exemplis ostendere, pro comperto habeo.

Incursum omnis scarlatinae, non secus ac aliorum exanthematum febrilium, comitantur aegritudo quaedam totius corporis, major minorve lassitudo, motusque difficultas, et frigoris sensus, qui auctus inducit luridum horrorem. Cum his calor solito major alternat, et brevi excipit. Aeger tristis fit, subindeque de dolore capitis, nausea, et ad vomitum nisu, cui tandem aliquando ipse vomitus supervenit, conqueritur. Insigni etiam somnolentia afficitur,



afficitur, et coryza una cum epiphora (si observationibus Mortoni et aliorum fides habenda sit) nonnunquam, licet raro, vexat. Eodem fere tempore vel paulo posteaquam invasit morbus, aliqua sentitur in faucibus internis molestia, ac simul rigor colli, et potius difficultas quam vorandi dolor. Cutis calida et arida est, pulsusque arteriarum crebriores et validiores, interdum etiam duriores, evadunt. Haec symptomata, quanquam quolibet per diei decursum tempore accesserint, sub vespera noctuque ingravescent. Sitis urget, et pyrexia accenditur nunc numerosioribus signisque gravioribus, praecipue inquietudine et saepe delirio, stipata. Indicia omnia posthac intenduntur. Cum aucto gutturis dolore simul aegrius deglutitur. Si minus antea, nunc crebrior fit respiratio, et difficile peragitur. Spiritus haud olet, sed plurimum calet. Fauces internae ubique tument et rubent, haeque partes, imprimis uvula, velum pendulum palati, et tonsillae, maculis albidis, quae vere sunt crustae mucosae, et quarum nonnullae ulcuscula obtegunt, pus bonum effundentia, et sanatu haud difficilia, brevi obductae perspiciuntur †.

Lingua,

† Quamvis, in plerisque conditionibus, inflammationem faucium erysipelatofam, in paucis tamen phlegmonodeam esse, eoque apasle-



### 3 DE SCARLATINA CYNANCHICA.

Lingua, quae sub initium arebat, in omni parte, praeter apicem et margines, qui humidi et rubicundi sunt, humore spisso et flavescente prorsus illita est; totumque os interdum viscido mucro oppletur. Urina, quae coloratior est, parce secerñitur; aliquibus vero in exemplis est suae in sanitate conditioni parum dissimilis. Alvus quandoque aperta, saepius durefcit. Ægrotus nunc cibum cuiuscunque generis non solum non desiderat, sed penitus averfatur; sitique instante, potum, ob nauseam quam movet seu auget, obque doloris in deglutitione vehementiam, vel omnino non pofcit, vel faltem a multo abftinet.

Hjs

ma interdum aeque ac cruftas et ulcera formari, observatur. Praeterea, in quibusdam inflammatio ita fanatur, ut constitutio partis integra maneat, seu, uti loquuntur, *resolutione* terminatur. Quod ubi ita feliciter evenit, nec ulcera nec apostema reperiuntur, fauciumque vitii natura ab aliis rebus exploranda est. Quinimo, et vitium ipsum interdum vel penitus abest, vel tam parvum extat, ut neque de eo conqueritur aeger, nec visu facile deprehenditur. Nihilominus, in his exanthemata notabilius tardiusque sese produnt; et pyrexia, fynochae faciem induens, lenior plerumque invenitur. Hujusmodi exempla, numero modo majore, modo minore, in qualibet scarlatina epidemica, reperiuntur. Et constat quidem, ex historiis morbi ab auctoribus traditis, si non imperfectae sint, scarlatinam forma tali benigna fuisse grassatam.



His semet ita habentibus, die a principio morbi plerumque tertio, maculae plus minus latae, ex papulis innumeris, perexiguis, confertis, vix eminentibus, et obscure rubentibus, constantes, in cute cum pruritu erumpunt, sensimque serpentes, inter se confluunt. Tandem colore et numero, quibus primis diebus admodum variare solent, constantiores factae, totam ferme corporis superficiem, nunc minus nunc magis saturato colore, suffundunt. Primum in facie comparet efflorescentia, collo, et pectore, dein vero, spatio viginti quatuor circiter horarum, subinde celerius tardiusve, in brachia, truncum, artusque inferiores diffunditur. Manus et digiti, qui tument, rigent, et tactu dolent, quandoque notabiliter rubent. Partes exanthematis obrutae, imprimis facies, manus, atque pedes, aliquantum intumescunt, cutisque digito compressa albescent, remoto, mox iterum rubescit.

Eruptio, tum quoad tempus quo primum sese monstrat, tum quoad durationem, multoties variat. Nam, licet ut plurimum triduo post primam morbi accessionem, tamen alias citius alias ferius apparet, et quo citius eo peior, quo ferius eo lenior morbus. Evanescit etiam nonnunquam, frigore corpori adhibito, et vitium gutturis utique augetur. Cum vero aliquot dies, tres nempe vel quatuor,



quatuor, perduraverit, pallescit, potiusve fuscum adipiscitur colorem, et faciei partiumque aliarum subsidente simul tumore, cum cuticulae desquamatione decedit, diversas partes eo, quo comparuerat ordine, relinquens. Antequam in furfuraceas convertatur squammas, cito abscedentes, epidermis, in vesiculas passim, albas, plerumque vacuas vel aëra solum continentes, miliares pustulas quam plurimum referentes, eoque quibusdam morbo parum expertis ita imponentes, ut pro miliaribus habent, saepe elevatur †. Quocirca, vesicatione largiore facta, cuticula tandem dehiscit, aspera fit, demumque non sine ingenti, quo vexantur aegri, pruritu desquammatur, et eo magis, quo amplius fuerit exanthematis obsita.

Exanthematis prodeuntibus, pyrexia saepe, quamvis non semper, ut aliqui opinantur, remissionem patitur, et quo magis, eo postea benignior morbus; quoniam commodius subsequitur desquammatio, et laesae fauces maturius sanantur. Verum saepius, postquam comparuere, fauces in statu fere manent eodem, neque pyrexia minuitur, neque est aliis symptomatis mutatio, donec inchoaverit

† Auctores passim, praeque caeteris expert. M. Ant. Plenciz Vienne Tractat. de Scarlatina, parag. v. et clar. Withering account of the scarlet fever, &c. p. 116. 117.



rit desquammatio. Hoc tempore, in istis sub hac morbi forma multo numerosioribus exemplis, ubi scarlatina haud infeliciter finitur, protinus sensimque mitigatur pyrexia. Nunc quoque, nimirum die septimo feriusve, arteriae tardius micant, modici sudores erumpunt, fauces a suo vitio levantur, somnum redit, et ciborum appetentia, saluteque sua pristina, fruitur aeger.

Complures tamen eorum, qui ita convalescunt graviterque non aegrotabant, prima, secunda, vel hebdomada a dissipata scarlatina tertia, hydrope corripuntur. Nimis frequens haec scarlatinae sequela quibusdam patescit indicis, notatu maxime dignis, quippe quae morbum, ne rite amotus sit, admodum perniciosum secuturum esse, praemonent. Valescientes, primo artuum lassitudines et dejectionem virium paulatim ingravescentes, queruntur, animum abjectum habent, noctes degunt insomnes, et urinam subrubram, immo, saepe sanguinolentam †, et sedimentum furfureum deponentem, parca quantitate, cumque ardoris sensu, reddunt. Cutis semper sicca. Sitis perpetuo vexat, et escae appetitus multum diminuitur.

Hydrops

† Navier comment. de rebus, &c. part. I. vol. 4. p. 338. et Plenciz tract. parag. vii.



Hydrops tandem supervenit, et ab aliquo faciei, vel circa pedum maleolos, tumore nasci confuevit. Brevi crescit, nuncque unam nunc alteram corporis partem magis occupat. Anasarcae species frequentissima; ascites autem et hydrothorax interdum offenduntur. Cerebrum per raro hydrops petit; sed, ubi incidit, coma-vigil, delirium, et caecitas exinde sequuntur †.

Opportunum si afferatur auxilium, minime lethalis hydrops post scarlatinam adoriens est, et facile cedit. Ast, aliquibus medicinam facientibus, longe plures rapientem, quam ipsa scarlatina, contigit vidisse. De illo clar. Plenciz, sua ex experientia neque parva, conclusiones quasdam breviter narrat, et quas non abs re erit referre. Notavit *1mo*, ‘ Quod iste leucophlegmaticus status superveniat potissimum illis, qui copiosis aut malignis scarlatinae exanthematis afficiuntur. Vidi tamen benignissimae scarlatinae ingentem totius corporis tumorem advenisse. *2do*, ‘ Quod illi, qui majorem cutis decorticationem experiuntur, soleant etiam magis tumere, quam alii. Interim ‘ observavi valde magnum tumorem in aliquibus, qui ‘ nullam experiebantur decorticationem. *3tio*, Quod infantes facilius, et magis tumeant, quam illi, qui sunt ‘ aetate

† Withering account, p. 17.



aetate provectiores. 4to, Quod aegri magis tumeant  
 in hyeme quam in aestate; item illi magis, qui tempo-  
 rius libero se exponunt aëri, quam qui in debita tran-  
 spiratione degunt. Tandem, 5to, Quod iste hydropi-  
 cus status periculosior sit, et plures exinde moriantur,  
 quam ex primo scarlatinae statu †.

Materiam purulentam diu effundentes, aliquando in  
 variis corporis partibus, post scarlatinam, abscessus subnaf-  
 cuntur. Sunt et aliae affectiones anomalae, quandoque  
 cum scarlatina conjunctae, aut illam excipientes, quarum  
 mentionem fecerunt auctores, sed eas, utpote levioris mo-  
 menti, rariusve observantur, praetereo.

Morbi est supra descripta species frequentissima. At,  
 in multis exemplis, symptomatis longe gravioribus scar-  
 latina stipatur, et in unaquaque re cynanchen malignam  
 tam plurimum refert, ut internosci haec ab illa non pos-  
 sit ‡. Quam ob causam, et quoniam eo plus periculi  
 scarlatinae inest, quo magis symptomata cynanche ma-  
 lignae communia semet ostendunt, ea breviter memorabo.

B

Scarlatinam

† Tractat. parag. viii.

‡ Celeb. Cullen, First Lines, parag. DCLXXVI. 3. Clark's obser-  
 vations on fevers, &c. p. 212. &c. Home et Gregory praefect.



Scarlatinam itaque malignam praenunciare solent frequentia, rigor, nempe, et calor sibi invicem succedentes, donec hic constantior et solito intensior evaserit; ingens anxietas, nausea, cui brevi accedit vomitio, et dejectiones crebrae. Vultus, qui aliquando rubescit, saepius pallescit, et aegri, propter rejectiones nimis violentas, syncope periclitantur. Fertur etiam, lenem cephalalgiam, et totius corporis molestiam, quae paulatim increfcit, aegros quandoque prius vexare, quam alia accesserint. Affectus gutturis, quod perpaucis horis postquam prima apparuere indicia, lugent aegrotantes, hic valde premit. Nihilominus, deglutiendi facultas tam laesa haud fieri solet, ut ex faucium conditione, quam docet inspectio, suspicari fas sit, et ea potius a musculorum deglutionis imbecillitate, quam a dolore pendere videtur. Crustae partes inflammatas obsidentes, quae sunt coloris cineritii vel lividi, rapide crescunt, et abscedentes, ulcera patefaciunt, ex quibus emanat fanies acer, foetidus. Ulcerum est circumscriptioni, quae sub initio coccinea, citus pallor; nunc quoque, humor tenuis et olidus ex naribus et ore effluit, adeoque acer, ut non modo nares ipsiusque aegrotantis labia corrodat, sed etiam, digitos, brachia, partesque omnes quas tangit infervientium. Receptus idem in ventriculum humor, quod saepius, potissimum junioribus, incidit,

qui



qui haud sedulo excreant, admodum ciere valet vomitiones, tormina, tenesmus, et frequentes dejectiones, quae vires magnopere frangunt. Quinetiam, si eum vasa lymphatica absorbeant, intumescunt et tactu dolent; horumque tumor, et iste ingens oedematofus totius colli, ad periculum usque pertingens, quod gravi morbo saepe fit, periculum suffocationis non parum adaugent. Jam spiritus celer et perdifficilis evadit, nonnunquam et stridet, quasi ex toto impediretur, et foetorem pessimum emittit, adstantibus vix tolerandum. Ea est vocis, si ulla adhuc persistet, rauco, qualis in affectionibus faucium gutturiisque venereis observatur. Tandem videntur, si inspicias, quam maxime inflammatae omnes fauces, et gangraenae affici. Eodem fere tempore, grumi materiae subnigrae nonnunquam expuuntur, solidis putridis factis et solutis valde similes.

Supra, in hoc morbo saepe respirationem admodum laborare, edictum fuit, et verosimile est, ex inspiratione strepente, voce rauca et tussi clangosa, laryngem et tracheam parem inflammationem interdum participare †. Equidem in cynanche maligna auctorum, quamvis non adhuc, quantum discere potui, in hac scarlatinae specie, quod talia,

† Vide Plenciz, parag. xxxix. Clark, p. 210.

alia, quae utrique communia sunt, symptomata suadent, fida cadaverum inspectio comprobavit †. Utut vero res se habeat, experientia, permultos extinctos fuisse infantes repentina suffocatione, fatis edocuit, signis cynanches trachealis simul apparentibus.

Primo, secundo, rarius die tertio, efflorescunt, quales jam definivi, in cute maculae. In paucis erysipelatosae, in exemplis aliis pustulosae, reperiuntur. Quae in hac quam in altera specie magis irregularis, five initium, five tempus durationis respicias, eruptio, facilius etiam a frigore, vel ab alia quavis causa, evanescit; suntque inde gutturis laesio et febris peiores. Insuper, in aliquibus nulla per totum morbum adest eruptio, et in aliis cutis affectio solum innotescit insigni pruritu, calore, et cuticulâ desquamata.—Pyrexia neutiquam refringitur, eruptione facta; sed circiter hoc tempus diarrhoea, et vomitus, praesertim in adultis, si non penitus cessent, lenius saltem vexant.

Pyrexia hanc conditionem comitans, debilitate universa maxima, pulsu sub initium parvo, duro, frequenti, et plerumque

† Confer Withering dissertat. inaugur. de cynanche gangraenosa, p. 8. Lieutaud precis de la medicine, edit. 2. Par. p. 519. &c. &c.



rumque irregulari, exacerbationibus quam constanter vespertinis et remissionibus matutinis, designatur. Ægre fertur in hoc statu laborantibus sanguinis detractio, et repetita, licet parca, saepius succumbere facit. Sanguis primo missus interdum crusta coreacea obtegitur; progrediente tamen morbo, crassamentum ejus laxum, totaque massa quasi solutior, invenitur.

Haec morbi species vere exitiosa nullum tenet constitutum cursum. Namque plurimi gravate aegrotantium, secundo tertiove die, dum alii quocunque alio ad octavum usque, exanimati sunt. Phthisi pulmonali lacessiti, diuque pedetentim recedentes, nonnulli ad plures migrant. Quibusdam, antequam diem obeunt supremum, facies, quae pallida est, et collum intumescunt, summa sputum ejiciendi impotentia simul adest, exindeque respiratus pene impeditus. Porro, alii ab inopinata haemoptysi aut epistaxi e medio tolluntur. Si ita fauste, insolenter licet raroque eveniat, ut aeger revalescat, symptomata eodem ac in benigno morbo ordine decedunt; rubor nempe cutis in fuscum convertitur, riteque consequitur decorticatio; modici prorumpunt sudores; calor parum sentitur; arteriae, quae antea crebro, exiliter et inaequaliter, aliquanto tardius, firmitus, et aequalius movent; tu-

mor faciei et colli externus minor fit; crustae faucium abscedunt, et exulcerationes sanescunt; respiratio liberius peragitur; acies oculorum, antea hebescentium, pristina restituitur; vesci appetitus et somnus redeunt, aegrotumque summopere reficiunt.

### D I A G N O S I S.

Morbus, vel a propriis indiciis, vel a proprio eorum, quae licet ei ac aliis communia sint, concursu dignoscitur. Quamvis huic optime inserviunt libri de Nosologia Methodica conscripti, quorum omnibus perspicuitate et elegantia Synopsis Cullen longe praestat; tamen hic, quibus rebus morbus de quo agitur, ab aliis eum referentibus internoscatur, separatius et plenius quam solus faciat character, percurrere, non supervacaneum censeo. Quoniam igitur, quatenus guttur afficitur, nonnulli morbi, scarlatinae similes, uti cynanche tonsillaris, &c. notae quaedam ad discrimen commemorari debent.

Primi incurfus comitibus, signis aliquibus incertis et utrique communibus, scarlatina non facile a cynanche

tonsillari



tonfillari distinguitur. Illa autem a contagione semper; haec nunquam, sed plerumque, a frigore corpori applicato, ducit originem. Morbum non perpeffi sunt contagioni illius obnoxii soli, et debilitas undecunque oriatur pejori morbo viam sternit; huic vero opportunitatem dat consuetudo, et aliquem saepe adoritur in vitae curriculo. Somnolentia, et febrilia, quam in cynanche tonfillari, saeviora symptomata, primam accessionem scarlatinae comitantur. In plerisque adest illius exemplis, cum pulsationis sensu, dolor pungens, et totius corporis laesio, e gutture videtur oriri; at, qui hac afflicti, dolorem cum calore urente obtusum persentiunt, et molestia ab initio universa. Faucium tumor in illa magnus, cum inflammatione phlegmonodea concolor, citius crescit quam in hac, crustis, sub quibus latent plerumque ulcera serpentina, necnon faucium irregulari et rubicundo tumore, notata. Sed, eruptione prodeunte, ut in specie morbi frequentissima prope tertium diem fere semper accidit, de genere ejus, nunc fatis manifesto, amplius dubitari nequit. Parum quidem incommodi sub utrovis laboranti, si venam ejus secare, vel procrastinares, donec certior de morbo factus fueris, vel ex toto omitteres. Nam vix necessarium in cynanche tonfillari generalem sanguinis detractionem, usus aliquorum abunde testatur, et emetica in utriusque initio

remedia praestantissima esse. Quum demum est scarlatina inimicior, et cynanches malignae imaginem reddit, pulsus arteriarum parvi, frequentes, saepe irregulares, prostratio virium insignis, anxietas, vomitus, et diarrhoea, quicquid dubii de morbi natura prorsus dirimunt.

Aphtha infantum sese prodit escharis albidis, ad linguae margines primum comparantibus, et labia, gingivos, totumque os internum, demum occupantibus; atqui linguam in scarlatina crustae ne unquam tenentes, amygdalas, velum pendulum palati, et uvulam, primum obsident. Pyrexia aphthae rarissime comes est, eisque exemplis, quibus adfit, oris affectui superveniens, non contagiosa; ista vero scarlatinae admodum contagiosa ab initio vexat, et, quae brevi patefcunt in cute, exanthematis certius dignoscitur. Plura, si iis sit opus, restant discrimina; sed prolata sufficiant.

Cum adhuc in dubio animus est, utrum scarlatina cynanchica ullo modo, nisi gradu solo, a cynanche maligna differt, cumque in nonnullis exemplis morbus huic omnino similis, nimirum, cum ulceribus faucium serpentibus et febre typhode, modumque curationis eundem poscens, ex eodem contagionis fonte profluit, utique necessarium



mihi videtur, fufius a morbis ei aliquando vicinis illam internoscere.—Hujufmodi exemplum imprimis habeo gastritidem eryfipelatofam. Namque eam inter peffimamque, praefertim fub ejus initio, fcarlatinae fpeciem difcrimen facere, eft admodum difficile; quippe quibus tam multa funt, uti debilitas magna, anorexia, naufea, vomitus, quocum aliquando confociantur dejectiones frequentes, anxietas, fitis, deglutitio et fpiratio difficiles, rubor faucium eryfipelatofus, pulfus parvus, frequens, et nonnunquam irregularis, cum aliis pyrexiae fignis, communia †. Pro veris iftis acceptis, probe tamen alium ab alio difcriminare commodum erit. Nam ad venaefectionem in gastritide eryfipelatofa aliquando decurrendum eft ‡: Verum perniciofe ageres fanguinem in iftis fcarlatinae exemplis, qualia refert gastritis, detrahère. Quodam vero tenus inflammationem ventriculi eryfipelatofam, per epigaftrii ardorem et dolorem, qui, utpote non tam acutus ac in phlegmodea, medici eft, ne pro anxietate fola habeatur, cavere; per vomitionem aliaque ventriculum laborare oftendentia, ante comparentia quam ea faucium; perque caufae naturam, quae morbum effecerit, utrum

C

nempe

† Vid. Cullen. de gastritide eryfipelatofa, *First Lines*, par. cccxc.

‡ Id par. cccxcii.

nempe acre quodlibet in ventriculo sumptum fuerit, vel contagioni scarlatinae non patuerit aeger, agnitum iri confido. Quinetiam, contra, infauftissima scarlatinae species, a primo suo insultu, somnolentia, indiciis catarrhi, ut coryza et epiphora, et generali quadam cervicis aegritudine, de qua gutturisque vitio magis conqueritur aeger, quam de ventriculo, stipatur, et a contagione orta publice grafatur.

Insuper, raro evenit, sub hac scarlatinae specie, instrumenta respirationis prorsus illaesa manere. Et constat enim, tam signis externis quam cadaverum sectionibus, ad laryngem et tracheam ipsam pertingere, in nonnullis conditionibus, a propria sua sede inflammationem. Quod cum factum fuerit, respiratio, quae aliter saepius in hoc morbo satis commoda est, difficilis fit, et sub inspiratione strepit; voxque adest rauca, et tussis clangosa. Vitium, tamen, faucium istas cynanches trachealis notas praecedit, et comitatur. In cynanche etiam vere tracheali, pyrexia est fynocha, et non contagiosa; at in hoc scarlatinae statu, typhus est, et pessima debilitatis nota, putredine nempe, stipata.



De istis signis, quibus morbum, de quo differimus, ab alio quovis fauces itidem adoriente, fecernere possumus, fatis ut spero scriptum est; deinceps de discrimine a morbis potius summum corpus, quam alias ejus partes obfidentibus, dicatur.

Cl. Mortonus, qui scarlatinae mentionem fecit, seque in ea guttur interdum inflammatum et gangraena affici †, vidisse memoravit, pro nihilo magis quam specie quadam rubeolae habuit. Verum, licet ambo simul grassari observentur ‡, tamen, qui sub uno laboravit, minime igitur ab altero liber constitutus est. Morbi etiam specie eruptionis in cute nonnihil distant. In rubeola enim sunt interstitia angulosa, quibus in pectore potissimum separantur papulae exiguae, confertae; his in scarlatina numerosioribus, illa defunt, et propterea passim in cute est rubor floridus, et istiusmodi quasi cutis vino rubro perfusa foret. Tussis porro, praeludiumque catarrhale cito in rubeola semet ostendunt; non autem omnino in scarlatina, nisi in pessima ejus forma, quae, ubi incidit, certius distinguitur  
pyrexia

† Mortoni oper. tom. 3. p. 44. et 54.

‡ Tom. citat. p. 43. 44. ubi utriuslibet fere omnia utrique communia esse, asseruit Mortonus.

pyrexia typhode, et exanthematis, die secundo apparentibus. Huc quoque accedit, quod minimus est in morbilis gutturi affectus, et quod non adsunt in faucibus crustae. Denique, in plerisque exemplis, natura epidemici, et utrum aeger ab alterutro antea correptus fuerit, si nosci queant, una cum rebus jam traditis, haud dubium dabunt discrimen.

Miliaria, licet aliquis sua dubia jure moveret, utrum morbus sit idiopathicus necne †, facile tamen a leni scarlatina dissepitur. Namque eruptionem illius praecedunt anxietas, suspirium frequens, punctio cutis insueta, fudor olidus, ex quo solo forte gignitur eruptio. Papulae in miliaria faciem non occupantes, sunt rubrae, discretae, et earum apices, post unum alterumve diem, pustulas minimas, albidas, brevi manentes, ostendunt. Guttur etiam incolume est. Pustulae milii semen referentes interdum cum scarlatina maligna conjunguntur; sed cynanche simul gravius premit. Praeterea, fertur, miliariam a contagione non procreari, et idcirco publice nunquam pervagari ‡.

Lenissima

† Consulat lector Cullen Synop. tom. 2. p. 141. 142. et First Lines, parag. dcxcv. et seq.

‡ Idem. parag. dcxcvii.



Lenissima scarlatinae species, qualem vidit et descripsit Sydenhamus, alique, quoniam vitio faucium saepe caret, et quousque cutis afficitur, variolam confluentem simulet. Haec autem cum pyrexia insigni, anxietate, et vomitione aggreditur, eoque ab illa facile secernitur. In fere aliis omnibus nostri morbi conditionibus, de cynanche imprimis conqueritur aeger; sed in variola, non prius formantur pustulae, quam tumor faucium, cum salivatione, supervenerit.

Circumscripta fedes, natura in plurimis exemplis non contagiosa, guttur semper illibatum relinquens, cum perpetua feri tenuis e parte inflammata exsudatione, quippe quae erysipelati propria sunt, eam a scarlatina clare distinguunt.

§ Si quis inter cynanchen malignam et scarlatinam anginofam distinguere velit, historiam nostram, qua amborum indicia conscribuntur, perscrutetur. Quum autem medici omnes quos orantes audiavi, et nonnulli quorum scripta relege, cynanchen malignam cum scarlatina simul pertractaverint, et quum Cullen de hac differens ad illam relegaverit, ita verba de utroque facere, meum esse duxi.

## C A U S Æ R E M O T Æ

Dividuntur in praedisponentes et occasionales, seu excitantes.

C A U S Æ.

## CAUSÆ PRÆDISPONENTES.

Infantes, quam adulti et ætate provectiores, sexus muliebri, quam virile, et utriusque sexi debiles, quam integri, ad scarlatinam procliviores fere semper fuerunt estimati. Et credo quidem, juniores contagioni hujus pariter ac aliorum exanthematum quam maxime patere. Utrum vero necne, major eorum numerus, liberior et frequentior mutua inter eos communicatio, qua contagio facilius ab aegrotante ad sanum transfertur, difficultas iis medicamenta exhibendi, et adulti morbum forsan in sua pueritia jam passi, fecerunt, ut pueri plus quam adulti consilio medentis egerint, ficque originem dederint opinioni, quae, et antehac et nunc, inveteravit de illorum proclivitate, non dicere ausim.

Qui semper notaverant mulierum, quam virorum, majorem numerum sub scarlatina laborare, medici fere omnes antiquiores confestim illas, quam hos quodammodo corporis habitu opportuniore fieri, in sententias iverunt. Marem vero ac foeminam aequaliter obnoxium esse, ex observatu nupero et accuratiore procul dubio compertum est,



est, tum etiam, ob officium, nempe aegrotis astandi et ministrandi, has saepius corripit. Quod enim Withering † pro conjectura posuit, id Clark ex experientia stabilivit ‡. Hicce sedulus observator invenit, numerum eorum utriusque sexus aegrotantium, quorum aetas nondum exsuperit viginti annos, pene eundem esse; quod plane probat eandem esse opportunitatem, etiamsi distet multum, ob memoratam causam, foeminarum numerus et marium, ultra hoc vitae tempus.

Luculenter exposuit experientia, (qualiscunque sit contagii in mortales prima potestas,) saepius, quam benevalentes, infauſto morbo irritabiles atque imbecillos tentari. Hinc, si opinari liceat ea, quae actioni contagionis receptae inferviunt, etiam primae receptioni infervire, item jus foret, tales homines pro praedispositis habere. Ex hac morbosa ac irritabili corporis constitutione forsitan est, quod si infantes vexet dentitio, si in menstruis sint foeminae, si a morbo convalescat aliquis, vel adhuc eo laborat, novus morbus faevior evadit.

Quinetiam, quibusdam traditur scarlatinam, cum frequentissime

† Withering account, &c. p. 2.

‡ Clark observations, &c. p. 204. 205.

quentissime tum gravissime in plebiculam faevire †. Hujus sunt causa multae variaeque res, inter quales multitudo plebeiorum, commercium inter eos valde liberum, quibus contagium facile propagatur, domus parvae immundae minimeque perflatae quas habitant, diaeta parca et tenuis qua utuntur, prava morbi curatio, censentur; hae enim corpus haud dubie infirmant, itaque faciunt, ut benignus in malignum convertatur morbus.

Nonnihil scarlatinae malignitatem temperies coeli, et anni nimis calida tempestas adaugent ‡. Calor enim nimius vel diu corpori applicatus, homines vi qua pollet stimulantē

† Clark, p. 203. &c.

‡ Id. p. 216. et Haken dissert. inaug. de Febre Scarlatina 1781, Gottingae, p. 19. ubi, circa scarlatinam malignam Herbipoli, ann. 1766 grassantem, traditur, ‘quo diebus canicularibus vicinior morbus, eo pejor.’

Hic annotare vellem, quod solummodo, de meo sensu, cum morbus cum diathesi asthenica confociatur, qualem plerumque clar. Clark tractasse contigit, tum calida noceat tempestas. Namque, constitutione phlogistica comitante, frigus potissimum laedit, ut legenti patēat ex Huxham observat. de Aëre, &c. p. 96. et Pelug, Hafniae chirurgi, observ. qui retulit, ‘aërem frigidum et siccum huic morbo favere;’ Haken dissert. p. 29.



stimulante irritabiliores reddit, vires eorum tandem exhaurit, eoque dat proclivitatem ad diriorem morbum.—

Hae sunt quae de opportunitate, eamque efficientibus, ab auctoribus accepi. In omni parte hanc doctrinam minime absolutam scio esse, atque utrum debiles an validi, cuivis contagioni magis obnoxii sint, me nunquam posse ex proprio, parvo quidem observatu, dicere fateor.

## CAUSA OCCASIONALIS.

Ut de caeteris fere omnibus epidemice grassantibus morbis dicas, ita definita contagio scarlatinae causa unica est. Hoc adeo innotescit, ut vix egeat probatione. Morbo, ubicunque apparuerit, semper gradatim pervagante; qui aliis atque aliis regionibus insident, diversisque escis et potionibus vescuntur, homines infestante; eis tamen solum, qui contagioni obvii fuerint, eisque igitur catervatim, uti plebeiis et pueris, quibus, cum caeteris sui ordinis ac aetatis, tam sanitate quam morbo substante, summum parumque idoneum intercedit commercium, invadente; scarlatinam per contagionem propagare, et per eam solum; ita manifestum fit, ut nihil magis: Etiam si in aliquibus rationibus, cum primum adoritur, unde pro-

gressa fuerit, nequeat ostendi. Hujus ac omnis contagii multo caliginis natura obducta est, seu quo pacto agit, et ab ea symptomata edita. Hoc nihil melius probare potest, quam paucas ex multis quas de hac re auctores protulerunt, opiniones referre.

De hoc morbo, quem vix ducebat contagiosum, ita locutus est Sydenhamus, ‘ Hic morbus nihil aliud mihi  
 ‘ videtur, quam mediocris sanguinis effervescentia a progressae aestatis calore, aut alio aliquo modo excitata †.’  
 Mortonus de scarlatina et morbillis asseruit, quod ‘ ab  
 ‘ eadem causa evidenti, scil. ambientis aëris injuriis, five  
 ‘ frigore in poros cutis admissio, five miasmate contagioso  
 ‘ in eosdem poros invadente, uterque effectus originem  
 ‘ suam trahit ‡.’ ‘ Causa continens seu immediata est  
 ‘ venenum spiritus inquinans, quod non tantum in primo  
 ‘ morbi stadio malignitate sua spiritus obruit, sed massam  
 ‘ sanguinis agitando eam in colluviem acrem, prae caeteris  
 ‘ omnibus fermentis colliquefacit; unde ||, &c.’—Navier, qui morbum 1753 Catalauni vidit, ex morbo pecorum epidemico hanc febrem per contagium ortam esse arbitratur,

† Sydenhami oper. § 6. cap. 2. p. 260.

‡ Mortoni op. tom. 3. p. 43.

|| Ejusd. tom. p. 22.



arbitratur, et causam ejus in miasmate, quod cum morbilloso comparat, acri, caustico, et putrefaciente consistere †. ‘ Nullus dubito,’ ait Plenciz, ‘ quin statuam, quod causa materialis scarlatinae consistat in certis seminibus animatis multiplicabilibus; eodem fere modo, uti scimus et videmus, alia semina animalium et vegetabilium ultro propagari et multiplicari.’ Opinatur etiam haec semina, vel in corpore posse latere diu inertes, donec pervenerint ad certum debitumque eorum maturitatis terminum, vel ab aliquibus causis, quales sint tempestas humida, euronothi, alique australes venti afferri. Dein vero, et ab his causis in actum deducuntur, multiplicantur, humores inficiunt, et scarlatinam interdum inopinanter producunt ‡. Pelug, chirurgus Hafniae, qui 1779 ibi et Lipsiae, versionem Germanicam Tractatus Plenciz in vulgus edidit, et ex observatis suis quaedam tradidit, scarlatinam potissimum a suppressione aucta perspirabilis materiae procreari censet; et, si a sola retenta materia perspirabili oriretur, catarrhalem dicendam esse; si ex ira, aliave animi commotione, bilis simul moveretur, biliosam nasci scarlatinam, quae saepius et inflammatoria sit; si fomes putridus in corpore adsit, scarlatinam malignam

† Comment. de rebus, tom. 4. part. I. p. 339.

‡ Tractat. parag. xxxi. et seq.

lignam excitari, quae rectius putrida nuncupanda †. Qui pro imprimis contagioso habet, ponit Withering, virus quoddam contagionem esse, quod initio in membranam pituitariam, vel Schneiderianam narium et faucium infidet, mucumque oblinentem in suam naturam convertit; itaque, quantitate aucta, per oesophagum in ventriculum, per laryngem ad pulmones, per tubos Eustachianos ad aures, et a naribus ad oculos, atque cerebrum ipsum, serpit. Quoniam igitur contagio tales partes prius inficit, quam alios praestat effectus, ad morbum arcendum praemonet, emeticum quamprimum sumi, fauces saepe et diligenter cum solutione lixivii caustici in aqua lavari, et sternutamentum in nares immitti; pariterque, ex experientia sua, haec omnia ad rem meditatam maxime apta, affirmat. Virus autem in corpore acceptum, uti putat, praecipue in nervos impetum facit. Hos enim primo infirmos reddit; sed inde fit, ob quasdam systematis nervosi leges, quod instituaturs reactio pro ratione debilitatis ‡.—Haken ratus est, ‘ hunc morbum fere semper enasci a for-  
‘ dibus primarum viarum, et quidem biliosis post transpi-  
‘ rationem suppressam ||.’

Proposito

† J. C. Haken dissertat. p. 29 30.

‡ Withering account, p. 61.—70.

|| Dissert. inaug. p. 42.



Proposito meo exemplorum affatim est. Nec animus fert opiniones haece separatim evertere; quaedam enim, ab exiguo et fallaci observatu originem ducunt, ideoque tam lubrico innixae sunt fundamento, ut ferme sponte corruunt. Pro hujusmodi exemplo, imprimis duco illam Sydenhami ipsius. Nam, quolibet anni tempore, scriptis extat, et frequentius forsan in vere quam in autumno, grassari scarlatinam †. Hujusmodi etiam sunt, quas de hac re tradiderunt Haken et Pelug; quia saepe scarlatina oritur, ubi causae, quales finxerunt, prorsus absunt, nec, licet adsint, tales effectus valent edere. Hypothesi Plenciz, secundum quem morbi exanthematici a miasmate animato proveniunt, plurima obstant. Omnes enim nostrorum corporum leges, morbique phaenomena tali ad-versantur, et eam, quanquam ille ingeniosus magnopere conatus, ne quidem vero similem fecit. Nec magis aridet ista, quae, modum quo exanthemata propagantur, enucleat, statuendo, quandam humorum fermentationem contagium ciere, hosque mutare in suam indolem. Ne-

gari

† Plenciz parag. xxx. ubi haec scripsit, ‘ Viginti et aliquot annorum spatio, ego hic Viennae illam saepius circa aequinoctium vernali, quam alio tempore, observavi; quo tempore etiam observarunt D. D. Schulzius, Navier, aliique.’

gari non potest, quod non modo virus contagiosum infinite adauctum sit, sed et hic auctus per mutationem alicujus, nec parvae humorum portionis fieret, oporteat. Verum vix, ac ne vix quidem, talem mutationem recta in humores contagionis operatione, simili modo, quo chemica peragitur assimilatio, produci credendum. Nam, si revera ita esset, quoniam novus chylus ab assumpto cibo perpetuo formatur, cum caeteris humoribus commiscetur, et tandem in eos convertitur; itaque novum pabulum contagioni assidue praeberetur, et cutis semper debet efflorescere. Nequeo igitur eorum, qui nostros arbitrantur assimilari miasmate contagioso humores, in sententias concedere.

Contagionem Withering dixit, non tantum primum arripere membranam faucium et narium, ejusque mucum quodammodo in suam naturam permutare, sed etiam ex hoc solo fonte per totum corpus dimanare. Nonnunquam vero nulla observatur gutturis affectio; nec de eo per totum morbi decursum conqueritur aeger. Et, licet aliquando emetica, quod Withering notavit, si haec brevi postquam prima comparuerint indicia adhibeas, morbum arceant; num tamen membranam faucium mucosam noxa imprimis adoriatur, an secus, jure disputari potest.



potest. Si amoveatur, emeticis tempore adhibitis, febris, crederefne fauces prae caeteris partibus contagionem contaminare, ideoque suum ob situm eam vomitione posse abluī?

Contagionem scarlatinae applicatam phaenomena consequentia, quadam in corpore animale solo insita potestate, et quae forsan in systemate nervoso pendet, regi videntur. Haec potestas ita facere observatur, ut certo ac definito temporis spatio contagio augetur, et e corpore, quod posthac a tali sit immune, rite emitteretur. Fateor equidem, quo haec efficiuntur me prorsus modum latere. Qui humores fermentatione quadam in contagii indolem verti credunt, analogia commutationis chemicae, opinionem suam firmant. Et nonne alteram conversionis aquae in succos vegetabiles varios analogia juvat? Saepenumero arborum diversarum rami fructiferi eodem nascuntur trunco, et mala insita una cum sua prole fert pyrus. Immutatio quam subit aqua, cum in latices adeo diversos ut sunt hi succi, convertitur, magna saltem ex parte, si penitus non, ab actione vasorum, fieri videtur. Modo fortassis eodem, scilicet vasorum actione, exanthemata possint produci. Tales vero coniectiones analogia sola suffulciuntur. Ex tantum abest ut ex ea in omnibus recte dispute-

tur,

tur, ut similitudinis specie saepe decipiamur. Hic etiam, cum tantummodo constat ratiocinium ex analogia, quae in rebus abditis ultro sese offert, et cum igitur cavillationi locus nunquam non pateat, in promptu semper est cuiquam objicere doctrinae, et res haudquaquam facilis, semper nobis visa, vel rectissimas opiniones defendere. Quocirca non est cur amplius de morbi causa et natura contagii dicam, aut plenius investigem, quatenus insipienter aut recta ratione, de iis locuti sunt homines. Modum equidem credo, quo operat in corpus, effectusque suos praestat contagium, inter naturae arcana esse, acie humana ne unquam attactura.

## P R O G N O S I S.

Medicum, in plerisque morbis, de eorum eventu posse certe praesagire, ad famam ejus et commendationem quam plurimum confert; maximam enim scientiam jure demonstrat. Nec medici solum interest, sed et aegrotantis. Nihil enim magis, ad symptomata vel praecavenda vel medenda conducit, quam ea praesentire. Prognosis autem, in aliquibus morbis, et in nullo magis quam in scarlatina,



scarlatina, ex circumſpectione ſumma et accurata confideratione quas meretur, utpote res ſane maximi momenti et perquam difficilis, debet inſtitui. Si moliremur, ad melius efficiendum, quae morbum ſtipant vel comitantur, et quae eum ſolent conſequi, eorum ratio haberi oportet.

1. Poſtquam morbus aggreſſus fuerit, eventus quodam tenus prognofci queat per genium epidemicum, ſive malignum ſive benignum, et per indicia ipſa, quorum illa, in ſecunda hiforiae parte memorata, infauſtum promittunt eventum. Quo enim plus refert cynanchen malignam, eo ſemper pejus. Tametſi vero ab ea longe diſtet, tamen haud defunt exempla, quibus lethalis evaſit. In adultis, pariter ac in junioribus, cum eruptio, quae cito apparuerat, ſubito recedat, et cutem lividam et oedematofam relinquat, cumque pyrexia vehemens, et delirium ſimul accedant, et potiffimum ſi diarrhoea ſuperveniat, etſi guttur parum vitietur, ſummum denunciatur periculum. In hiſce conditionibus, oculi parum ſentiunt, et tunica albuginea aequaliter rutila eſt †. Si mutant maculae ſedem, ſi modo palleant, modo rubeant, metuendum eſt, ne delirium, imo mors, conſequatur; debilem enim et abnormem incitationem deſignat.

E

Cum

† Withering account, p. 9. 10.

Cum morbus fauces potissimum petit, infantes plus quam adulti periclitantur, quia illi nec gargarismis uti, nec sputum edere valent; itaque faniem ulcerum, quae diarrhoeam movet, intestina ipsa nonnunquam rodens, saepe deglutiunt, et quia minime dociles auxiliis difficillime obediunt. Quinetiam aliquando scarlatina, licet primo, vel ad desquamationem usque, benigna videtur, improvise in periculum ruit. Et pyrexia enim subito accenditur, majora adfunt insomnium, inquietudo, et mentis alienatio, et phrenitis admodum simulatur. ‘Tales casus,’ ait Plenciz, ‘plures habui, et ideo cautior redditus de morbi natura, facile ante debitum terminum definire non soleo †.’

2. Restat nunc ut quaedam proferamus de prognosi, quantum ad affectum scarlatinam sequentem attinet, seu tumorem hydropicum, in quo nonnunquam posita est maligna morbi natura. Plures enim, quosne dicam adstantes, sed et medici in vado constitutos esse credunt, brevi languescunt, novumque capiunt morbum, quem plusquam priorem saevire aliqui viderunt ‡. Veruntamen, abeunte scarlatina,

† Confer Plenciz Tract. parag. c. ci.

‡ De Haen Ration. medend. continuat. tom. I. part. I. cap. vii.

p. 138. &c. Plenciz tract. parag. xlii.



scarlatina, si convalescentes a pyrexia immunes sint, et cibum ut solebant, appetant, consueta redeat alacritas, omnesque excretiones naturaliter se habeant, concludendum est, minus esse periculi ne excipiat hydrops. Verum, hoc demum adoriens, si cum pulsu febrili conjunctus sit, majus portendit periculum, quam si sit sine febre †.

## C U R A T I O M O R B I.

Cuiusmodi hujus morbi medelam perpendenti, tres species vel varietates praecipue pertractandas, perspicuum est; in quarum enim singulis quaedam est medendi diversitas.

I. Scarlatina cum synochia leni, et cum parvo vel nullo faucium vitio:

II. Scarlatina cum synocho, et mite faucium exulceratione.

III. Ista, in qua, quam in prioribus, inconstantior est efflorescentia, et in qua fauces afficiuntur ulceribus serpentibus,

† Loc. proxime citat.

pentibus, et gangraenosis, una typho comitante.—Ne vero in his singulatim percurrentis iusto diutius morer, ut operam navarem, illico meipsum accingam.

I. *De scarlatina proprie dicta.*—Medentis auxilii, in morbo adeo benigno, ut hic fieri solet, vix indiget aeger. Inter praecepta, simplicem esse curationem, edoctus experientia Sydenhamus posuit. Ut aeger a carnibus vel cibo ex iis confecto, et a potu generoso abstineret, regimine antiphlogistico ex omni parte uteretur, et nimium caloris frigorisve externi incrementum evitaret, sit necessarium. Quae fere astricta, alvum solve laxantibus, qualia sunt, manna, cremor tartari, decoctum tamarindorum cum fenena, et clysmatis ex similibus parandis. Si, quod eruptionis sub initium quandoque accidit, infantum ac puerorum epilepsiae convulsionibus distraherentur corpora, parca sanguinis per hirudines detractio, si signa sint plethorae, et pediluvium, balneum tepidum, et opiata multum profint. Si itidem aegrotantis coma in terram prostrati, ad posteriorem cervicem vesicatorium amplum applicares, Sydenhami praestantiam imitatione consequeris. Nimia medicamentorum exhibitione, ne plus detrimenti quam emolumenti capiant aegri, omnes caveant. Plenciz narrat, quod morbus de sua indole benignus, sit hac ratione ma-

‘ lignus



‘ lignus†.’ Et ipse Sydenhamus asserit, ‘ quod si plus negotii  
 ‘ aegris faceffamus, vel lectulis continenter incarcerando,  
 ‘ vel cardiacis aliisque remediis supervacaneis nimis docte,  
 ‘ et (ut vulgo videtur) secundum artem supra modum  
 ‘ ingestis, morbus statim intenditur, et aeger non raro  
 ‘ nulla alia de causa, quam nimia medici diligentia, ad  
 ‘ plures migrat ‡.’

II. Dixi de ea morbi specie, cui medicina facile sub-  
 venit; nunc ad eam transeundum est, quae magis cum  
 medicamentis pugnat. Ut scarlatinae cum synocho, et  
 gutturis exulceratione leni medearis, quae sequuntur, ea  
 expleantur. 1. Diathesin inflammatoriam principio mo-  
 derari; 2. Debilitatem, quae semper nimiae succedit in-  
 citationi, et pro ejus ratione est, remove; et 3. Quas-  
 dam affectiones levare, et morbi consequentiam praeca-  
 vere.

1. *Principio diathesin inflammatoriam moderari*; quod fie-  
 ri potest, imo, Ufu regiminis antiphlogistici, vel illas vitan-  
 do vel minuendo irritationes, quae assidue fere corpori  
 admoventur. Tales sunt impressiones in organa sensuum  
 factae,

† Tractat. parag. lii.

‡ Sydenhami oper. sect. vi. cap. 2.

factae, veluti sonus, luxque nimia, et calor externus. Corpus in modica temperie per totum morbum habendum. Licet forte in hoc, non aliter ac in aliis quibusdam exanthematis, nonnihil conducat ad reddendam leniorem pyrexiam, eruptionem comitantem, frigus tempore admotum; quum tamen certo certius postea admodum noceat, tutius fore arbitror eo non uti. Namque a summo repellit corpore sanguinem, ab eo efflorescentia minuitur in cute, necnon inflammatio intenditur gutturis†. Quinetiam, ubi fuerat libere applicatum frigus, supervenire catarrhi symptomata, Cullen se vidisse, quum epidemica erat proxima hyeme scarlatina, prodidit. Memoravit etiam, quod ob frigus adhibitum, nec exanthemata evanescebant, nec cynanche gravius premebat, et sub morbi finem, quo tempore frigus amotum erat, inde catarrhus sensim mitescebat; sed caetera symptomata prout in aliis exemplis se habebant. Motus corporis et omnes ad  
cogitationem,

† Withering account, p. 12. 13. et Huxhami observat. de Aëre, tom. I. p. 95. 96. ubi de hoc morbo, quem placuit illi *febrem anginosam* nuncupare, locutus est, haecque habet verba, ‘quod vero jam  
‘ (Junio ann. 1734) cutim magis petat, quam superiore mense, ob  
‘ majorem aëris calorem esse arbitror, humores elicientem extra: medio  
‘ enim Maio, cum atmosphaera, pro anni tempore, erat maxime frigida, dolor ac faucium tumor urgebant gravissime.’



cogitationem, maximeque ad animi perturbationes ducentes, impulsus, utpote corpus stimulant, quanta fieri potest cura, vitandi sunt. Cibus acefcens atque vegetabilis, ut sunt farinaria omnia et lac, parcius fumatur, et animalis prorfus prohibeatur. Liquores spirituefi et fermentati (nifi fint tenuiffimi excepti) quoniam magnopere incitant, aegro non bibendi. Pro potu tamen, aquofi, qui acidis admixtis gratum faporem conceperunt, in ufu fint, Parum laedunt, quoniam perfpirationi favent calidae parce fumptae, infufiones aromaticae. Æger aurantia et quofcunque alios fructus maturos ad libitum habeat. In ventriculo, quod fub initio pyrexiarum faepe fit, a cruditatibus stimulus oriens, vomitu et dilutione; in inteftinis a faecibus retentis, medicamentis laxantibus et clyfmatis, fedulo debet auferri.

2. Remediis fedantibus, qualia imprimis funt variae exinanitiones, quae tenfionem, tonum, actionemque fanguiferi fystematis diminuunt. Cum enim actio ejus pro magna parte ex tono, hic ex vaforum tenfione, quam fluida his contenta impertiunt, proficifcatur, perfpicuum eft, minuta humorum quantitate, minorem quoque fanguiferi fystematis, eoque univerfi corporis, actionem et impetum fieri. Nihil fane evidentius eft, quam quod *fanguinis miffio*  
potentiffima

potentissima sit ad hoc efficiendum. Hujus igitur speciei principio, si pyrexia vehemens sit cum pulsu pleno, cumque magno faucium tumore, sanguis e brachio detrahatur. Adulti quam juniores, et qui in autumno † seu frigida tempestate morbo configunt, hanc evacuationem plus requirunt, meliusque tolerant, quam alii, iisdem temporibus non aegrotantes. Remedium hoc, quoties eo opus sit, primum adhibeatur oportet.—Fateor autem, quod de usu venaesectionis in hoc morbo sententiae scriptorum inter se adeo discrepant, ut quando ad eam decurri debeat, ab indiciis vix queat judicari. Multum quidem pendet in genio epidemico, qui experientia sola potest cognosci. Attamen observatus aliquorum docuerunt istud, quod a signis praecedentibus expectandum foret, ex venaesectione non profluisset commodum. Quapropter, et quia debilitas postea consequitur, a multa et repetita debet abstineri.

*Alvi purgatio* remedium est antiphlogisticum, et inter caetera in cura hujus speciei commendatum fuit ‡ : Ex-  
perientia

† Withering account, p. 75. Cullen praelect. Huxham, aliique.

‡ Sauvages Nosol. Method. tom. 1. p. 454. Amstelodami, 4to, &c.



perientia tamen utilitatem ejus nequaquam confirmavit. Morbus manifeste levis ab ea factus fuit vere periculofus, et faepe subito lethalis †. Noceat etiam faniem ulcerum, quae forfan ex ventriculo vomitione expelli poterit, per tota intestina diffundendo. Praeterea, sine dubio constat, utcunque veram ejus rationem reddere difficile fit, quod scarlatina pariter ac rubeola gravior fiat, subito eruptionis recessu. Itaque, omnino vitanda, uti humores a superficie corporis ad intestina elicit, purgatio.

Hoc tempore *emetica* praestantissimo sunt auxilio, et providum eorum usum maxima laude fere omnes prosequuntur. Faucibus haud obsunt, etsi a flatu inflammato eorum aliter fore pertimescendum fit. Ventriculum depleri faciunt, itaque nocuis liberant ingestis, et magnam, quae prorsus jugulare infantes minitatur, muci tenacis copiam a faucibus abluunt. Quoniam alvus simul aperta servari debet, eo tartarum emeticum, quod alvum etiam laxat, et quod gradatim sumptum certiore dosi exhiberi potest, aliis praeripit palmam. Praeterea, eadem remedia, viscera agitando, bilem comportantes ductus emulgent, viisque a primis fordes expellunt biliofas. Actione in

F

ventriculum

† Withering account, p. 81.

ventriculum sua, quem inter et cutem insignis est consensus, diaphoresin movent, itaque calorem corporis praeter naturam accensum comminuunt, totamque pyrexiam multum temperant. Nec apud scriptores non deprehenduntur exempla, ubi penitus fugatus ex tempestivo usu eorum morbus fuit †. Qui summis laudibus emetica effert, ea per morbi decursum saepius adhiberi Withering suadet, imo nonnunquam deteriore morbo bis indies; et praxis aliquorum in novissima epidemica scarlatina, qui antehac periculum nunquam faciebant, comprobavit, quod frequens tartari emetici in dosibus parvis exhibitio, medebatur contra aliquas ventriculi affectiones, pejorem fieri morbum indigitantes.

*Diuretica* optima medicamenta esse, emeticis exceptis, inveniebat Withering. Magna ex hujusmodi medicaminum caterva, ad votum alcali vegetabile fixum solum respondebat, quod quantitate drachmae unius vel binarum, potu vel alio aliquo haustu, sumptum erat.

Sudatio graviora symptomata omnia reddat, si sit vel medicamentibus vel calor externo excitata. Quoniam

† Withering account, p. 77. Clark observ. p. 250. 251.

niam autem ad eam proclivitas aegrotanti prodest, ideo sub initio, cum cutis sicca et calida est, et delirium inflat, pediluvium saepe adhibendum; et in nonnullis exemplis, ubi tumor faucium simul ingens est, balneum tepidum quam plurimum juvat †.

II. Ad vires aegrotantis fere devictas instaurandas; diaeta quam antea sit lautior, et appetentiae aegri accommodata: Cerevisiam et fortem, *Porter* appellatam, potissimum adultus, et vinum aqua moderatum pro potu habeat.—Nunc quoque cortex Peruvianus sit auxilio, et exhibeatur plurimi suadent ‡.

Modo supra memorato, ita benignus evadit, ut cortici, utcunque dato, facile cedit morbus.—Medici autem caveant, ne usu ejus intempestivo inflammatoriam adaugeant diathesin, eoquē morbum maligniorem efficiant: Et nonnulli

† Clark observ. p. 254. Withering account, p. 95.

‡ Morton op. tom. 3. p. 48. &c. De Haen Ration. Medend. Contin. p. 144. Pleniz Tract. parag. 1. Clark Obs p. 346. et forsan Sydenhamus. Quisnam alius quam scarlatina morbus est, quem appellare *Febrem Stationariam* illi placitum fuit? Confer ejusdem op. Lugduni ed. 1754, p. 579. et seq. de Feb. Stat. cum p. 283. ubi anginam tractat.



nulli enim plurimum damni usum ejus, et forsan ob hanc solam causam, sequi viderunt. Reditum sanitatis multum accelerant modica exercitatio, coelumque rusticum. Vestimenta calida esse debent, ad perspirationem promovendum, et hydropem arcendum.

III. Alia in secunda specie indicatio restat, nimirum, ut quaedam symptomata leventur, et, frequentissima morbi sequela, hydrops sanetur.

Est tumor faucium plerumque notabilis, et interdum suffocationem minitatur. Hoc statu, laudata fuit, et nonnunquam vesicatorii nuchae applicatio prodest, alias vero nocet †, et remedium nunquam ambiguum non est. Detractio sanguinis per hirudines vel cucurbitulas, sub angulis maxillae appositae, inflammationi gutturis in scarlatina, quam in cynanche tonsillari, non tam accommodata est; etsi ad eam, cum magnus faucium urget tumor, confugiendum.—Crustae ut facilius ejiciantur, et mucus iste viscidus, quo saepe infarciuntur fauces, gargarismis uti semper necessarium. Hi ex aqua et lacte, ex infuso salviae cum aceto et melle, conficiuntur, et per syringem in fauces infantum sine periculo injiciuntur.

Per

† Wühering, p. 91. 92.

Per purgantia, quae religiose sub morbi finem sumpti esse solent, tumores hydropices, hanc speciem morbi saepe excipientes, plerumque recedunt. Si autem ita humor evacuari nequeat, tunc diuretica prospere adhibeas; sed sudatoria, ut De Haen ait, vix unquam, prae impenetrabili fere corporis superficie. Diureticis aliis, non sine ratione gravi, anteponuntur cremor tartari, acetum scilliticum, et scilla calomelana adjuncta, quoque repellitur hydrops, exercitatione, indusio laneo, cibo generoso, et medicamentis tonicis ac stimulantibus.

III. Ne nimis fero ad extrema veniam, de tertia curationis parte aggredior addicendum. In hac pessima morbi specie consilia medendi sunt, 1. Vires aegroti sustentare et restituere; et 2. Quibusdam symptomatis ire obviam †.

Ad

† Haec morbi species, quae cynanchen malignam refert, saepius quam praevideant medici, reperiatur. Ex 131 aegrotantibus, quos hyeme 1778—79 Novi Castellii, curabat Clark, 33 sub morbo cynanche malignae auctorum omnino simili laborabant, et in hisce omnibus contagio eadem erat. In scarlatina, quae hac urbe proxima hyeme epidemice grassabatur, exempla eorum, qui sub hac forma aegrotabant

Ad primum respondendum exinanitiones omnes fugiendae sunt. Sanguinis detractionem et purgantia admodum nocere inter omnes consentitur. Acida vegetabilia, nitrum, haustus salinus, aliaque antiseptica et refrigerantia, cautissime utenda sunt; saepe enim purgationem movent, et quandoque nimiam sudationem. Eorumque usui superveniat syncope †.—Nisi principio, cum nausea et rejectiones spontaneas vexant, emetica vix adhibenda. Morbum postea certius citiusque curari, compererunt Fothergill et Clark, illis in exemplis ubi fuerant mature sumpta antimonialia. De usu medicamentorum vomitoriorum ita Huxham tradit: ‘ If nausea and vomiting  
 ‘ were urgent, I ordered a gentle emetic; especially for  
 ‘ adults, which was so far from aggravating the pain of  
 ‘ the throat, as might be imagined, that it generally  
 ‘ greatly relieved it; nay, in children, it was often necessary to make them puke frequently, otherwise the vast  
 ‘ amass

aegrotabant tam numerosa erant, ut dicere nequeam utrum cynanchen malignam, an scarlatinam anginosam, plus referebat. Cullen hujus epidemicae mentionem fecit, cum de scarlatina praelegebat; quo tempore passus est omnes morbi varietates in ea commisceri. Equidem praelectionibus suis clinicis, sub nomine cynanches malignae, de ea Home et Gregory differuerunt.

† Fothergill Works, vol. I. p. 378. 389.



‘amass of tenacious mucus would quite choak them †.’—

Non, nisi ut deliquium animi praevertatur, cantharides admoveres. Exhaustit plurimum sudatio, sed lenis juvat diaphoresis. Ad hanc conciliandam, adque aegrotum simul sustinendum, serpentaria, contrayerva, et medicamina leniter stimulantia, cum fructu usurpata fuerunt ‡.

In quorum operatione, jure summam collocamus fiduciam, sunt remedia, vel conjunctim vel separatim data, cortex Peruvianus et vinum. Si quorundam pathologorum opiniones credas, optimum illud medicamentum primum in humores vi antiseptica agit. Quum autem cortex effectus post ejus in ventriculum injectionem tam repentinos praestat, prius certe, quam ipse massam sanguinis ingressus fuerit, ideo illos nequaquam ex operatione in humores esse repetendos, sed ab actione tonica, vel leniter stimulante, in nervos ventriculi edi, et ab his in universum systema nervosum propagari, nobis colligere licitum est. Omnibus diuque cortex communis multum laudatus fuit, donec tractatus a Saunders de *cortice rubro* nuper prodibat. Ex experimentis ab eo institutis constat, hunc validiorem et usui accommodatiorem esse, et in mor-

bis

† Huxham Essay on Fevers, &c. p. 299.

‡ Fothergill.

bis omnibus, quibus hoc medicamentum necessarium venit, illi antehaberi. Pulvis corticis, prae formis vel soluti vel decocti, quae imbecillae sunt, assumendus; nihilominus, quavis sub forma detur. Cum extracto glycyrrhizae forma lincti a junioribus satis expedite deglutitur. Nimis libere vix dari potest, et ab initio ad finem morbi usque in usu persistet aeger †. Cortex, si constanter rejiciatur, aut si in quantitate debita non assumatur, quod ob deglutitionis dolorem ac difficultatem in scarlatina saepe fit, sub forma clysmatum ministretur oportebit; et hoc modo adhibitus, ‘eundem ac si per os assumptus fuisset, exerit effectum †.’

Vinum, caeteris omnibus stimulantibus, quoniam palato et ventriculo gratum est, et aqua adeo potest moderari, ut dosibus aptis dari queat, anteferendum. Quod velit aeger, id vinum habeat. Si illi non optio sit, vina rubra, ut Lusitanicum, vel id quod apud Britannos *claret* nomen sibi nactum est, quae maxime astringunt, aliis anteponenda. Vinum vel per se vel in potu communi sumatur. Medicamen hoc, et alia id genus, ob suam vim in ventriculum stimulantem, cito pulsus arteriarum frequentiam

† First Lines, parag. cccxiv.

‡ Plenciz, parag. Lf.

quentiam compescunt, et vim simul augent, perspirationem movent, sustentant, calorem minuunt, et a putredine aegro praecavent. Quocirca, ubi debilitas universa urget, ad delirium arcendum, adque vires instaurandas, quam plurimum conducunt. Rubor oculorum, calor corporis, pulsusque celer, qui in hoc morbo saepe observantur, ab usu vini deterrire videntur; sed ingens virium prostratio, et parvus, debilis, saepeque pulsus irregularis, usum ejus et necessitatem clare indicant †. Cortex igitur et vinum, sub hac scarlatinae pessima specie, semper in tantum adhiberi debent, quantum aegri constitutio ferre potest, et morbi indicia poscunt.

Frigus, licet plerumque enumeratum sit, inter optima tonica, tamen ob statum cutis nonnihil obstat. Cubiculum aegrotantis amplum, perflabile, potiusque calidum quam frigidum sit. Quoniam munditia semper grata est, stragula et indusia permutari expedit. Victus aegri debet esse ex fago, panado, juscule in quo vel pullus vel caro bubula decocta sunt, et ex cibo animali, si, quod saepe est †, eum appetat aeger: Potus ex cerevisia tenui aut forti,

G

feu

† Fothergill, p. 392.

† Ibid. p. 393. C. Colden, London Med. Essays, vol. I.



feu vino in aqua. Antequam vero deglutiit aeger vel cibos vel medicamenta, ut os et fauces rite gargarismis abluantur, cavendum.

2. In hac specie, quam in caeteris, sunt morbi numerosiora symptomata, nec non gravioris momenti. Eorum ne ullum periculosius quam est diarrhoea. Contra hanc calor lecti multum opitulatur. Calor enim temperatus corpus haudquaquam enervat, reficit potius, et ad superficiem eliciendo humores, exanthemata accumulat, cynanchen nonnihil levat, et aegrotum a torminibus, tenesmo, et dejectionibus frequentibus, tuetur. Caeterum posthac, si hoc dysenteriae symptomata calori adhuc obstitunt, confectio Japonica et opiata adhibenda. Cum tussis, si a sanie ulcerum irritatione oriatur, vexat, mucilago gummi Arabici aut infusio feminis lini, cum aliquot laudini liquidi guttulis, subinde assumpta, multum valent; si verum a dyspnoea, remedia generalia solummodo prodesse invenies. Ne crustae, quibus ulcera obteguntur faucium, vi externa abrasantur. Hoc incaute tentatum, haemorrhagia secuta est, symptomata omnia graviora reddita, et nova altioraque ulcera facta. Gargarismi commendati sunt diversi; sed partes aquae et lactis aequales, aut illa cum vino vel spiritu vini pauxillo, scopo

scopo optime satisfaciunt. Complures eorum, qui sub titulo antisepticorum prodeunt, veluti camphora, aceto soluta, tinctura myrrhae, aloes, &c. usurpantur; sed adeo ingrati sunt, ut aegrotos faciant talia remedia prorsus fastidire. Repetitam gargarismorum per syringem in fauces injectionem, cel. Pringle et Fothergill maximi fecerunt, et pleno collaudarunt ore †. Aër fixus, variis modis exhibitus, laudibus est ornatus; sed quomodo profuit, ignoro. Fallax experientia fuerit, quoniam semper validiora cum eo simul usurpantur remedia. Quanquam vi antiseptica pollere inveniatur, et idcirco in hoc morbo ad putredinem arcendam in pulmones trahatur, nonne tamen aër ita saturatus receptioni similis materiae a pulmonibus impar fit?—Si inopinata epistaxis superveniat, aeger in situ erecto teneri debet, turundae aceto frigido madefactae in nares trudendae sunt, et nonnulli ad usum opii simul hortantur.

† Pringle diseases of the army, p. 143. Fothergill, tom. I. p. 399.









